



ANALISIS GENERAL DE LOS EGRESOS HOSPITALARIOS AÑO 2005

Septiembre de 2006

La información de los egresos hospitalarios del Sistema Isapre, permite obtener una aproximación del perfil de la morbilidad de la población beneficiaria, poniéndola a disposición de los distintos agentes del sistema de salud. Aún cuando desde el año 2001 hasta la fecha los datos registrados presentan un mayor grado de confiabilidad, todavía persisten, en algunos casos, diferencias con los datos registrados en el Archivo Maestro de Prestaciones Médicas del mismo año, respecto de ciertas patologías o condiciones de salud. Esto obedece, entre otras causas, a un mal registro, sobre o subnotificación de casos, especialmente llamativo en los partos, lo que permite explicar la menor tasa de natalidad estimada para el Sistema Isapre, si se compara con lo que ocurre en el sistema público de salud. Cabe hacer presente que, en el caso de los partos y cesáreas, por considerar más confiable la información contenida en el Archivo Maestro de Prestaciones, se usaron estos datos para el presente análisis.

1. Introducción

La información disponible sobre los egresos hospitalarios representa un indicador grueso de la morbilidad (enfermedades que afectan a las personas) de un país, ya que, por una parte, puede estar referido a la demanda y, por otra parte, al estado de la oferta de los servicios de salud.

Debido a que los datos de egresos hospitalarios no permiten individualizar al paciente, no es posible obtener tasas de incidencia de patologías, es decir, el número de casos nuevos que aparecen en un determinado período, generalmente en el transcurso de un año y que se asocian con enfermedades agudas, ni tampoco tasas de prevalencia, que corresponde a una estimación puntual de los casos nuevos y antiguos en un momento dado, que sirve para conocer el número de casos y su relación con la población total, de manera de poder establecer los riesgos de enfermar que tiene la población, fundamentalmente, por patologías crónicas.

No obstante la restricción señalada, es posible construir, para propósitos de análisis, tasas de egresos hospitalarios, según patologías o condiciones de salud, que dan cuenta del grado de uso de los servicios hospitalarios de alta complejidad para la resolución de los problemas sanitarios más relevantes y que es indispensable conocer para adecuar la oferta de los servicios de salud y para disponer los recursos financieros necesarios para satisfacer las necesidades actuales y futuras de la población beneficiaria. Constituyen, por consiguiente, indicadores generales que, desde una perspectiva sanitaria, permiten tener una aproximación del perfil de la morbilidad de los beneficiarios, en este caso, del Sistema Isapre.

La información de los egresos hospitalarios se obtuvo a partir de los Archivos Maestros de los Egresos Hospitalarios (AMEH) de las Isapres, correspondientes al año 2005 y los códigos de

las causas de morbilidad corresponden a la Clasificación Internacional de Enfermedades en su versión N° 10 (CIE-10) y fueron aplicados por dichas instituciones. Finalmente, cabe hacer presente, que estos datos son provisionales y no han sido auditados por esta Superintendencia de Salud.

2. Egresos hospitalarios por capítulo de causas según prestadores

Del total de egresos hospitalarios del año 2005, que alcanza a 248.169 eventos, el 16% corresponde a atenciones por embarazo, parto y puerperio, un 13% a egresos por causas tumorales, un 12% a atenciones por enfermedades del sistema digestivo, un 10% a afecciones urológicas y un 9% a enfermedades respiratorias, las que en su conjunto representan el 60% del total de los egresos hospitalarios, similar a lo que ocurrió durante el año 2004.

CUADRO N° 1
MORBILIDAD HOSPITALARIA POR CAPÍTULO DE CAUSAS
SEGÚN PRESTADORES, AÑO 2005

| CIE-10 Capítulo | CAUSAS | Prestador Privado | | Prestador Público | | Total | |
|--------------------|---|-------------------|------------|-------------------|------------|----------------|-------------|
| | | Egresos | % | Egresos | % | Egresos | % |
| Total | | 222.266 | 89% | 25.903 | 11% | 248.169 | 100% |
| XV | Embarazo, parto y puerperio | 34.555 | 89% | 4.219 | 11% | 38.774 | 16% |
| II | Tumores (neoplasias) | 28.296 | 91% | 2.745 | 9% | 31.041 | 13% |
| XI | Enfermedades del sistema digestivo | 25.457 | 87% | 3.833 | 13% | 29.290 | 12% |
| XIV | Enfermedades del sistema genitourinario | 22.952 | 91% | 2.315 | 9% | 25.267 | 10% |
| X | Enfermedades del sistema respiratorio | 19.136 | 90% | 2.221 | 10% | 21.357 | 9% |
| XIII | Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo | 13.383 | 91% | 1.329 | 9% | 14.712 | 6% |
| XIX | Traumatismos, envenenamientos y consecuencias de causas externas | 12.372 | 86% | 1.957 | 14% | 14.329 | 6% |
| IX | Enfermedades del sistema circulatorio | 10.874 | 88% | 1.549 | 12% | 12.423 | 5% |
| VII | Enfermedades del ojo y sus anexos | 10.977 | 96% | 417 | 4% | 11.394 | 5% |
| XVIII | Síntomas, signos y de laboratorio, no clasificados en otra parte | 7.524 | 86% | 1.275 | 14% | 8.799 | 4% |
| XVI | Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal | 7.882 | 92% | 671 | 8% | 8.553 | 3% |
| VI | Enfermedades del sistema nervioso | 6.764 | 94% | 415 | 6% | 7.179 | 3% |
| I | Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias | 5.514 | 88% | 722 | 12% | 6.236 | 3% |
| XXI* | Factores que influyen en el estado de salud y contacto con servicios de salud | 3.792 | 88% | 520 | 12% | 4.312 | 2% |
| IV | Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas | 3.064 | 88% | 429 | 12% | 3.493 | 1% |
| XII | Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo | 2.714 | 88% | 376 | 12% | 3.090 | 1% |
| XVII | Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 2.710 | 89% | 323 | 11% | 3.033 | 1% |
| V | Trastornos mentales y del comportamiento | 2.319 | 87% | 347 | 13% | 2.666 | 1% |
| VIII | Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides | 1.193 | 90% | 127 | 10% | 1.320 | 1% |
| III | Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos e inmunitario | 788 | 87% | 113 | 13% | 901 | 0% |

* Incluye sólo el código Z30

El 89% de las atenciones hospitalarias ocurrió en prestadores privados de salud y, el 11% restante, en prestadores públicos de salud, evidenciándose una disminución de un 2% en estos últimos, conforme a lo observado el año 2004, que fue de un 13%. En términos porcentuales decrecientes, entre la morbilidad hospitalaria por capítulo de causas de la CIE-10, que fueron atendidos en hospitales públicos, se encuentran los traumatismos y las enfermedades del sistema digestivo con un 14% y 13%, respectivamente, seguido de las afecciones circulatorias con un 12%. El año 2004, en primer lugar se encontraban las afecciones endocrinas con un 19%. Sin embargo, en términos absolutos la mayor frecuencia corresponde a las atenciones por embarazo, parto y puerperio, seguido de las enfermedades del sistema digestivo y las atenciones por tumores, siendo similar a lo observado durante el año 2004.

CUADRO N° 2
MORBILIDAD HOSPITALARIA POR CAPÍTULO DE CAUSAS EN MUJERES
SEGÚN PRESTADORES, AÑO 2005

| CIE-10 Capítulo | Causas | Prestador Privado | | Prestador Público | | Total | |
|--------------------|---|-------------------|------------|-------------------|------------|----------------|-------------|
| | | Egresos | % | Egresos | % | Egresos | % |
| Total | | 131.305 | 90% | 15.215 | 10% | 146.520 | 100% |
| XV | Embarazo, parto y puerperio | 34.555 | 89% | 4.219 | 11% | 38.774 | 26% |
| II | Tumores (neoplasias) | 17.559 | 91% | 1.633 | 9% | 19.192 | 13% |
| XI | Enfermedades del sistema digestivo | 12.407 | 87% | 1.868 | 13% | 14.275 | 10% |
| XIV | Enfermedades del sistema genitourinario | 12.641 | 90% | 1.361 | 10% | 14.002 | 10% |
| X | Enfermedades del sistema respiratorio | 8.702 | 89% | 1.032 | 11% | 9.734 | 7% |
| XIII | Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo | 6.795 | 91% | 665 | 9% | 7.460 | 5% |
| VII | Enfermedades del ojo y sus anexos | 5.940 | 96% | 240 | 4% | 6.180 | 4% |
| XIX | Traumatismos, envenenamientos y consecuencias de causas externas | 4.802 | 87% | 701 | 13% | 5.503 | 4% |
| IX | Enfermedades del sistema circulatorio | 4.651 | 88% | 649 | 12% | 5.300 | 4% |
| XVIII | Síntomas, signos y de laboratorio, no clasificados en otra parte | 4.042 | 85% | 702 | 15% | 4.744 | 3% |
| XVI | Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal | 3.883 | 92% | 340 | 8% | 4.223 | 3% |
| VI | Enfermedades del sistema nervioso | 3.554 | 93% | 254 | 7% | 3.808 | 3% |
| I | Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias | 2.658 | 88% | 364 | 12% | 3.022 | 2% |
| XXI* | Factores que influyen en el estado de salud y contacto con servicios de salud | 2.393 | 88% | 324 | 12% | 2.717 | 1% |
| IV | Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas | 1.857 | 89% | 229 | 11% | 2.086 | 1% |
| V | Trastornos mentales y del comportamiento | 1.358 | 87% | 210 | 13% | 1.568 | 1% |
| XII | Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo | 1.289 | 90% | 139 | 10% | 1.428 | 1% |
| XVII | Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 1.210 | 89% | 157 | 11% | 1.367 | 0% |
| VIII | Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides | 600 | 90% | 68 | 10% | 668 | 0% |
| III | Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos e inmunitario | 409 | 87% | 60 | 13% | 469 | 0% |

* Incluye sólo el código Z30

En el caso de las mujeres, en primer lugar, se encuentran las atenciones por fenómenos reproductivos con un 26% del total, destacando, en segundo lugar, las afecciones neoplásicas con un 13% y, en tercer lugar, los egresos por enfermedades del sistema digestivo con un 10%, los que conjuntamente representan el 49% del total de egresos hospitalarios, con porcentajes de atención en prestadores públicos de 11%, 9% y 13%, respectivamente, apreciándose una disminución al compararlo con el año 2004, que fueron de un 14%, 12% y 17%, respectivamente.

CUADRO N° 3
MORBILIDAD HOSPITALARIA POR CAPÍTULO DE CAUSAS EN HOMBRES
SEGÚN PRESTADORES, AÑO 2005

| CIE-10 Capítulo | Causas | Prestador Privado | | Prestador Público | | Total | |
|--------------------|---|-------------------|------------|-------------------|------------|----------------|-------------|
| | | Egresos | % | Egresos | % | Egresos | % |
| Total | | 90.942 | 89% | 10.686 | 11% | 101.649 | 100% |
| XI | Enfermedades del sistema digestivo | 13.048 | 87% | 1.964 | 13% | 15.012 | 15% |
| II | Tumores (neoplasias) | 10.737 | 91% | 1.112 | 9% | 11.849 | 12% |
| XI | Enfermedades del sistema respiratorio | 10.434 | 90% | 1.189 | 10% | 11.623 | 11% |
| XIV | Enfermedades del sistema genitourinario | 10.309 | 92% | 954 | 8% | 11.263 | 11% |
| XIX | Traumatismos, envenenamientos y consecuencias de causas externas | 7.571 | 86% | 1.256 | 14% | 8.827 | 9% |
| XIII | Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo | 6.588 | 91% | 663 | 9% | 7.251 | 7% |
| IX | Enfermedades del sistema circulatorio | 6.222 | 87% | 900 | 13% | 7.122 | 7% |
| VII | Enfermedades del ojo y sus anexos | 5.037 | 97% | 177 | 3% | 5.214 | 5% |
| XVI | Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal | 3.990 | 92% | 331 | 8% | 4.321 | 4% |
| XVIII | Síntomas, signos y de laboratorio, no clasificados en otra parte | 3.481 | 86% | 573 | 14% | 4.054 | 4% |
| VI | Enfermedades del sistema nervioso | 3.210 | 95% | 161 | 5% | 3.371 | 3% |
| VII | Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias | 2.856 | 89% | 358 | 11% | 3.214 | 3% |
| VIII | Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 1.500 | 90% | 166 | 10% | 1.666 | 2% |
| XII | Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo | 1.425 | 86% | 237 | 14% | 1.662 | 2% |
| XXI* | Factores que influyen en el estado de salud y contacto con servicios de salud | 1.397 | 88% | 196 | 12% | 1.593 | 2% |
| IV | Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas | 1.204 | 86% | 200 | 14% | 1.404 | 1% |
| V | Trastornos mentales y del comportamiento | 961 | 88% | 137 | 12% | 1.098 | 1% |
| VIII | Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides | 593 | 91% | 59 | 9% | 652 | 1% |
| III | Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos e inmunitario | 379 | 88% | 53 | 12% | 432 | 0% |
| | Sin clasificar | 0 | 0% | 0 | 0% | 21 | 0% |

* Incluye sólo código Z30

En el caso de los hombres, el 49% de los egresos hospitalarios se distribuye en 4 capítulos de causas, que son las enfermedades del sistema digestivo, afecciones tumorales (benignas y malignas) y sistema respiratorio con un 15%, 12% y 11% de participación, respectivamente, y un 11% correspondiente a enfermedades genitourinarias. Estas causas son atendidas en prestadores públicos de salud, en 13%, 9%, 10% y 8%, respectivamente. Con respecto al año 2004, la situación observada es similar, no obstante que los porcentajes de atención en prestadores públicos disminuyeron, alrededor de un 3%.

Cabe hacer presente, que las causas tumorales en los hombres se ubican en el mismo lugar de importancia que en las mujeres (2°), sin embargo son un 62% más frecuentes en ellas, por la mayor diversidad de órganos, especialmente reproductivos, susceptibles de dar origen a fenómenos neoplásicos, ya sean benignos o malignos, lo que también ocurrió durante el año 2004.

En forma general es posible señalar que la cantidad de egresos hospitalarios fue similar el año 2005 comparado con el año 2004. Durante el año 2005 fueron 248.169 eventos y el año 2004 alcanzó a 248.235 egresos. Al hacer un análisis comparativo en función de las tasas observadas, considerando las diferencias en la cantidad de los beneficiarios promedios de los años 2004 y 2005, que fueron 2.685.112 y 2.673.409 personas, respectivamente, los resultados son los siguientes. Durante el año 2004 la tasa de egresos por 100 beneficiarios fue de 9,2 y el año 2005 fue de 9,3, lo que equivale a un aumento real de un 0,4%. No obstante lo anterior, hubo una disminución en la tasa por 100 beneficiarios por capítulo de causas XV, correspondiente a embarazo, parto y puerperio, de un 18%, la que estaría determinada por una baja en la tasa de natalidad. Las tasas de los siguientes capítulos de causas por Tumores (II), enfermedades del sistema digestivo (XI) y genitourinario (XIV), tuvieron un incremento real de un 2%, 3% y un 5%, respectivamente, lo que podría obedecer a una mayor pesquisa de los problemas de salud vinculados a estas causas, asociado a un manejo hospitalario de los procedimientos terapéuticos vinculados con los cánceres, las enfermedades del sistema digestivo y genitourinario.

3. Morbilidad hospitalaria por capítulo de causas, sexo y edad

CUADRO N° 4
MORBILIDAD HOSPITALARIA POR CAPÍTULO DE CAUSAS EN MUJERES
SEGÚN GRUPOS DE EDAD, AÑO 2005

| CIE-10 | CAUSAS | FEMENINO | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|--------------|-------------|----------------|-------------|
| | | menor 1 | | 01-04 | | 05-14 | | 15-44 | | 45-64 | | 65 y + | | Total | |
| Capítulo | | | % | | % | | % | | % | | % | | % | | % |
| Total | | 7.741 | 100% | 6.143 | 100% | 8.065 | 100% | 81.335 | 100% | 33.411 | 100% | 9.825 | 100% | 146.520 | 100% |
| XV | Embarazo, parto y puerperio | 0 | 0% | 15 | 0% | 54 | 1% | 38.422 | 47% | 267 | 1% | 16 | 0% | 38.774 | 26% |
| II | Tumores (neoplasias) | 180 | 2% | 311 | 5% | 608 | 8% | 6.698 | 8% | 9.231 | 28% | 2.284 | 23% | 19.192 | 13% |
| XI | Enfermedades del sistema digestivo | 292 | 4% | 446 | 7% | 1.599 | 20% | 6.901 | 8% | 4.076 | 12% | 959 | 10% | 14.275 | 10% |
| XIV | Enfermedades del sistema genitourinario | 262 | 3% | 290 | 5% | 320 | 4% | 7.949 | 10% | 4.383 | 13% | 798 | 8% | 14.002 | 10% |
| X | Enfermedades del sistema respiratorio | 854 | 11% | 2.436 | 40% | 2.215 | 27% | 2.567 | 3% | 991 | 3% | 671 | 7% | 9.734 | 7% |
| XIII | Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo | 70 | 1% | 81 | 1% | 300 | 4% | 2.847 | 4% | 3.342 | 10% | 820 | 8% | 7.460 | 5% |
| VII | Enfermedades del ojo y sus anexos | 26 | 0% | 113 | 2% | 150 | 2% | 2.784 | 3% | 2.046 | 6% | 1.059 | 11% | 6.180 | 4% |
| XX | Traumatismos, envenenamientos y consecuencias de causas externas | 112 | 1% | 597 | 10% | 851 | 11% | 1.881 | 2% | 1.369 | 4% | 693 | 7% | 5.503 | 4% |
| IX | Enfermedades del sistema circulatorio | 45 | 1% | 32 | 1% | 87 | 1% | 1.724 | 2% | 2.313 | 7% | 1.099 | 11% | 5.300 | 4% |
| XVIII | Síntomas, signos y de laboratorio, no clasificados en otra parte | 214 | 3% | 403 | 7% | 499 | 6% | 2.073 | 3% | 1.122 | 3% | 433 | 4% | 4.744 | 3% |
| XVI | Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal | 3.938 | 51% | 65 | 1% | 14 | 0% | 149 | 0% | 34 | 0% | 23 | 0% | 4.223 | 3% |
| VI | Enfermedades del sistema nervioso | 81 | 1% | 94 | 2% | 221 | 3% | 1.764 | 2% | 1.419 | 4% | 229 | 2% | 3.808 | 3% |
| I | Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias | 257 | 3% | 727 | 12% | 423 | 5% | 1.007 | 1% | 450 | 1% | 158 | 2% | 3.022 | 2% |
| XXI* | Factores que influyen en el estado de salud | 997 | 13% | 88 | 1% | 88 | 1% | 1.178 | 1% | 293 | 1% | 73 | 1% | 2.717 | 1% |
| IV | Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas | 186 | 2% | 24 | 0% | 76 | 1% | 885 | 1% | 747 | 2% | 168 | 2% | 2.086 | 1% |
| V | Trastornos mentales y del comportamiento | 12 | 0% | 4 | 0% | 65 | 1% | 994 | 1% | 408 | 1% | 85 | 1% | 1.568 | 1% |
| XII | Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo | 27 | 0% | 91 | 1% | 173 | 2% | 684 | 1% | 368 | 1% | 85 | 1% | 1.428 | 1% |
| XVII | Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 187 | 2% | 204 | 3% | 149 | 2% | 525 | 1% | 239 | 1% | 63 | 1% | 1.367 | 0% |
| VIII | Enfermedades del oído y de la apófisis mastoideas | 7 | 0% | 63 | 1% | 121 | 2% | 235 | 0% | 197 | 1% | 45 | 0% | 668 | 0% |
| III | Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos e inmunitario | 12 | 0% | 57 | 1% | 52 | 1% | 168 | 0% | 116 | 0% | 64 | 1% | 469 | 0% |

*Incluye sólo código Z30

Al efectuar un análisis de los egresos hospitalarios por capítulo de causas, según sexo femenino y por grupos de edad, podemos observar lo siguiente:

- **Mujeres menores de 1 año**

Un 51% de las causas de morbilidad tienen su origen en afecciones del periodo perinatal. En segundo lugar, aparecen las enfermedades del sistema respiratorio, con un 11% de participación, debido a la susceptibilidad de adquirir enfermedades respiratorias infectocontagiosas como consecuencia de la inmadurez inmunológica que presentan los lactantes y las características de elevada propagación de las citadas patologías. En tercer lugar, se ubican las enfermedades del sistema digestivo, con un 4%.

- **Mujeres entre 1- 4 años**

El 40% de los egresos hospitalarios se debe a enfermedades del sistema respiratorio, seguido de las enfermedades infecciosas y parasitarias con un 12%, y los traumatismos y envenenamientos con un 10%. Estos últimos se relacionan con el inicio del deambular, la curiosidad propia de los niños a esa edad y el descuido de los padres.

- **Mujeres entre 5 - 14 años**

En esta etapa del desarrollo, también se encuentra en primer lugar las causas respiratorias con un 27%, seguido de las afecciones digestivas y los traumatismos con un 20% y 11%, respectivamente.

- **Mujeres entre 15 - 44 años**

En plena edad reproductiva, un 47% de los egresos hospitalarios obedece al estado de embarazo, parto y puerperio. Le siguen las afecciones del sistema genitourinario, digestivo y tumores, con un 10%, 8% y 8%, respectivamente.

- **Mujeres entre 45-64 años**

A partir de esta edad, en primer lugar, se ubican las causas tumorales con un 28%. En segundo lugar, las enfermedades del sistema genitourinario y, en tercer lugar, las del sistema digestivo, con un 13% y 12%, respectivamente, las que constituyen el 53% de los egresos hospitalarios.

- **Mujeres mayores de 65 años**

En estas edades, después de los tumores con un 23% de los egresos, aparecen las afecciones del sistema circulatorio y las enfermedades del ojo y sus anexos, ambas con un 11%.

En forma general, la morbilidad hospitalaria por capítulo de causas en mujeres, según grupos de edad, es similar a la observada durante el año 2004, con excepción de la disminución observada en embarazo, parto y puerperio, según lo expuesto anteriormente.

CUADRO N° 5
MORBILIDAD HOSPITALARIA POR CAPÍTULO DE CAUSAS EN HOMBRES
SEGÚN GRUPOS DE EDAD, AÑO 2005

| CIE-10 | Causas | Masculino | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|------|-------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|---------|------|
| | | menor 1 | | 01-04 | | 05-14 | | 15-44 | | 45-64 | | 65 y + | | Total | |
| Capítulo | | | % | | % | | % | | % | | % | | % | | % |
| Total | | 9.250 | 100% | 8.965 | 100% | 12.279 | 100% | 34.808 | 100% | 25.105 | 100% | 11.221 | 100% | 101.649 | 100% |
| XI | Enfermedades del sistema digestivo | 647 | 7% | 646 | 7% | 2.116 | 17% | 6.123 | 18% | 4.241 | 17% | 1.239 | 11% | 15.012 | 15% |
| II | Tumores (neoplasias) | 152 | 2% | 386 | 4% | 839 | 7% | 2.731 | 8% | 4.751 | 19% | 2.990 | 27% | 11.849 | 12% |
| X | Enfermedades del sistema respiratorio | 1.299 | 14% | 3.273 | 37% | 2.777 | 23% | 2.607 | 7% | 912 | 4% | 755 | 7% | 11.623 | 11% |
| XIV | Enfermedades del sistema genitourinario | 481 | 5% | 1.165 | 13% | 1.656 | 13% | 3.968 | 11% | 2.756 | 11% | 1.237 | 11% | 11.263 | 11% |
| XX | Traumatismos, envenenamientos y consecuencias de causas externas | 224 | 2% | 771 | 9% | 1.631 | 13% | 4.412 | 13% | 1.380 | 5% | 409 | 4% | 8.827 | 9% |
| XIII | Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo | 159 | 2% | 99 | 1% | 303 | 2% | 3.739 | 11% | 2.416 | 10% | 535 | 5% | 7.251 | 7% |
| IX | Enfermedades del sistema circulatorio | 223 | 2% | 48 | 1% | 167 | 1% | 1.996 | 6% | 3.020 | 12% | 1.668 | 15% | 7.122 | 7% |
| VII | Enfermedades del ojo y sus anexos | 38 | 0% | 111 | 1% | 125 | 1% | 2.694 | 8% | 1.442 | 6% | 804 | 7% | 5.214 | 5% |
| XVI | Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal | 4.121 | 45% | 54 | 1% | 34 | 0% | 49 | 0% | 43 | 0% | 20 | 0% | 4.321 | 4% |
| XVIII | Síntomas, signos y de laboratorio, no clasificados en otra parte | 356 | 4% | 485 | 5% | 551 | 4% | 1.293 | 4% | 901 | 4% | 468 | 4% | 4.054 | 4% |
| VI | Enfermedades del sistema nervioso | 100 | 1% | 155 | 2% | 261 | 2% | 1.370 | 4% | 1.151 | 5% | 334 | 3% | 3.371 | 3% |
| I | Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias | 412 | 4% | 888 | 10% | 509 | 4% | 904 | 3% | 374 | 1% | 127 | 1% | 3.214 | 3% |
| XVII | Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas | 302 | 3% | 443 | 5% | 395 | 3% | 302 | 1% | 149 | 1% | 75 | 1% | 1.666 | 2% |
| XII | Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo | 59 | 1% | 108 | 1% | 254 | 2% | 804 | 2% | 338 | 1% | 99 | 1% | 1.662 | 2% |
| XXI* | Factores que influyen en el estado de salud y contacto con servicios de salud | 361 | 4% | 144 | 2% | 220 | 2% | 459 | 1% | 314 | 1% | 95 | 1% | 1.593 | 2% |
| IV | Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas | 210 | 2% | 41 | 0% | 101 | 1% | 402 | 1% | 436 | 2% | 214 | 2% | 1.404 | 1% |
| V | Trastornos mentales y del comportamiento | 62 | 1% | 11 | 0% | 58 | 0% | 666 | 2% | 256 | 1% | 45 | 0% | 1.098 | 1% |
| VIII | Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides | 14 | 0% | 91 | 1% | 172 | 1% | 187 | 1% | 151 | 1% | 37 | 0% | 652 | 1% |
| III | Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos e inmunitarios | 30 | 0% | 46 | 1% | 110 | 1% | 102 | 0% | 74 | 0% | 70 | 1% | 432 | 0% |
| | Sin clasificar | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 21 | 0% |

Incluye sólo código Z30

Al efectuar un análisis de la morbilidad hospitalaria por capítulo de causas, según sexo masculino y por grupos de edad, observamos lo siguiente:

- **Hombres menores de 1 año**

Un 45% de las causas de morbilidad tienen su origen en afecciones del periodo perinatal, seguido de las enfermedades del sistema respiratorio con un 14% de egresos hospitalarios, similar a lo que se observa en el caso de las mujeres. Luego se ubican las enfermedades del sistema digestivo, con un 7%.

- **Hombres entre 1- 4 años**

El 37% de los egresos hospitalarios se debe a enfermedades del sistema respiratorio, seguido de las enfermedades de los sistemas genitourinario con un 13% y las enfermedades infecciosas y parasitarias con un 10%. Las causas por traumatismos y envenenamientos se ubican en el cuarto lugar, con un 9%, siendo esta última causa más frecuente en los hombres que en las mujeres.

- **Hombres entre 5 - 14 años**

En esta etapa del desarrollo, la primera causa es similar a la que presentan los hombres entre los 1 y 4 años, sin embargo, la distribución en términos porcentuales es diferente, ya que las enfermedades del sistema respiratorio disminuyen de un 37% a un 23%. Las causas digestivas se ubican en un segundo lugar con un 17% y le siguen las afecciones genitourinarias con un 13%. En cuarto lugar, se ubican los traumatismos y envenenamientos con un 13%.

- **Hombres entre 15 - 44 años**

En este grupo etario destacan las enfermedades del sistema digestivo, los traumatismos y envenenamientos, y las enfermedades del sistema genitourinario, con un 18%, 13% y 11%,

respectivamente. En cuarto lugar, se ubican las afecciones osteomusculares con un 11%, seguido de los tumores con un 8%.

- **Hombres entre 45-64 años**

A partir de esta edad, en primer lugar, se ubican las causas tumorales con un 19%. En segundo lugar, las enfermedades del sistema digestivo con un 17% y, en tercer lugar, aparecen las enfermedades del sistema circulatorio con un 12%.

- **Hombres mayores de 65 años**

En la tercera edad existe un franco predominio de egresos hospitalarios por causas tumorales con un 27%, seguido de las afecciones del sistema circulatorio con un 15% y las enfermedades del sistema digestivo y genitourinario, ambas con un 11%.

En forma general, al igual que en la mujer, la morbilidad hospitalaria por capítulo de causas en hombres, según grupos de edad, es similar a la observada durante el año 2004.

4. Principales causas de morbilidad hospitalaria

Al analizar las principales causas de morbilidad hospitalaria en las mujeres podemos señalar lo siguiente:

Las causas obstétricas directas, incluidos los partos, cesáreas y abortos, representan un 27% del total de los egresos hospitalarios. Le siguen los tumores malignos, las enfermedades del sistema osteomuscular, las enfermedades de los ojos y los traumatismos (accidentes), con un 8%, 5%, 4% y 4%, respectivamente. Estas causas principales son similares a las observadas el año 2004, pero con una disminución general en la tasa de egresos por 100.000 mujeres de un 2%. En los partos la disminución fue de un 21%, en cambio, los tumores malignos tuvieron un incremento de un 2%, lo que pudiera atribuirse, en el primer caso, a una disminución de la tasa de natalidad y, en el segundo caso, a una mayor detección y/o mayor uso de los procedimientos diagnóstico-terapéuticos hospitalarios vinculados con los cánceres durante el año 2005.

Si se exceptúa el cuidado por embarazo, parto y puerperio, las primeras causas de hospitalización corresponden a tumores malignos y, traumatismos y causas externas de morbilidad (accidentes), que muestran una alta correspondencia con la composición de la mortalidad. Cabe destacar el hecho que las hospitalizaciones por tumores malignos son un 34% más frecuentes en las mujeres que en los hombres, cuestión que podría explicarse por la mayor diversidad de órganos, especialmente reproductivos, susceptibles de dar origen a fenómenos neoplásicos de carácter maligno y a la mayor complejidad del manejo terapéutico de estas patologías, que requiere de internación hospitalaria para su realización.

A estas causas principales se suman otras que no tienen una alta traducción en mortalidad, como son las enfermedades de los ojos, de los sistemas digestivo, genitourinario y respiratorio y los trastornos mentales. En esta última causa, destacan los episodios depresivos agudos y recurrentes, siendo este hecho relevante, por cuanto el manejo de los cuadros depresivos es esencialmente ambulatorio, reservándose la hospitalización para los casos de Depresión Severa, fundamentalmente cuando existe riesgo vital asociado, por ideación suicida o intentos de suicidio. Sin duda, esta situación conlleva, por una parte, a mejorar el tratamiento ambulatorio de estos pacientes y, por otra parte, a adecuar los sistemas hospitalarios para

satisfacer estas nuevas demandas crecientes en salud. La tasa de hospitalización por esta causa es similar a la registrada durante el año 2004.

**CUADRO N° 6
VEINTE PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD HOSPITALARIA
EN MUJERES, AÑO 2005**

| N° | Códigos CIE-10 | Causas | Tasa por 100.000 mujeres | | |
|----|----------------------|--|--------------------------|--------------------------|-------------|
| | | | Egresos | Tasa por 100.000 mujeres | % |
| | A00-Z99 | Total | 146.520 | 11.417 | 100% |
| 1 | O82 | Parto cesárea | 19.827 | 1.545 | 14% |
| 2 | O80-O81 | Parto único espontáneo y con fórceps | 11.196 | 872 | 8% |
| 3 | C00-C97 | Tumores malignos | 11.584 | 903 | 8% |
| | C50 | Tumor maligno de la mama | 4.316 | 336 | |
| | C18 | Tumor maligno del colon | 935 | 73 | |
| | C91-C95 | Leucemias | 739 | 58 | |
| | C56 | Tumor maligno de ovario | 676 | 53 | |
| | C33-C34 | Tumor maligno tráquea, bronquios y pulmón | 525 | 41 | |
| | C53 | Tumor maligno del cuello uterino | 345 | 27 | |
| | C19-C21 | Tumor maligno rectosigmoideo, recto y ano | 245 | 19 | |
| 4 | M00-M99 | Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo | 7.457 | 581 | 5% |
| | M51 | Otros trastornos de los discos intervertebrales | 942 | 73 | |
| 5 | H00-H59 | Enfermedades del ojo y sus anexos | 6.180 | 482 | 4% |
| | H25-H26 | Cataratas | 1.273 | 99 | |
| | H33 | Desprendimiento de retina | 136 | 11 | |
| 6 | S00-T98 | Traumatismos, envenenamientos y otras consecuencias de causas externas | 5.503 | 429 | 4% |
| | S02-T12 | Fracturas | 1.642 | 128 | |
| | S03-T03 | Luxaciones, esguinces y torceduras | 641 | 50 | |
| 7 | N00-N39 | Enfermedades del sistema genitourinario | 4.848 | 378 | 3% |
| | N20-N21 | Litiasis urinaria | 924 | 72 | |
| | N17-N19 | Insuficiencia renal | 714 | 56 | |
| 8 | K80-K81 | Colelitiasis y colecistitis | 4.364 | 340 | 3% |
| 9 | O00-O08 | Aborto | 4.274 | 333 | 3% |
| 10 | O10-O92 | Causas obstétricas directas (excepto aborto, parto espontáneo y cesárea) | 3.601 | 281 | 2% |
| 11 | D25 | Leiomioma uterino | 3.413 | 266 | 2% |
| 12 | K35-K38 | Enfermedades del apéndice | 3.149 | 245 | 2% |
| 13 | J35 | Enfermedades crónicas de las amígdalas y adenoides | 2.910 | 227 | 2% |
| 14 | J10-J18 | Influenza - Neumonía | 2.175 | 169 | 1% |
| 15 | I00-I51, excepto I46 | Enfermedades del corazón | 1.696 | 132 | 1% |
| | I20-I25 | Enfermedades isquémicas del corazón | 152 | 12 | |
| 16 | A00-A09 | Enfermedades infecciosas intestinales | 1.987 | 155 | 1% |
| 17 | K40-K46 | Hernias de la cavidad abdominal | 1.740 | 136 | 1% |
| 18 | F00-F52, F54-F99 | Trastornos mentales | 1.542 | 120 | 1% |
| | F32-F33 | Episodio depresivo y recurrente | 712 | 55 | |
| | F31 | Trastorno afectivo bipolar | 185 | 14 | |
| | F20 | Esquizofrenia | 68 | 5 | |
| 19 | N80 | Endometriosis | 1.107 | 86 | 1% |
| 20 | N81 | Prolapso genital femenino | 921 | 72 | 1% |
| | | Otras causas | | - | |
| | R00-R99 | Síntomas, signos y de laboratorio no clasificados en otra parte | 4.744 | 370 | 3% |
| | | Las demás causas | 42.302 | 3.296 | 29% |

En el caso de los hombres, la principal causa de morbilidad hospitalaria es por tumores malignos, que representan un 9% del total de los egresos hospitalarios, destacando entre ellos las Leucemias y el Cáncer de Próstata. En segundo lugar, se ubican los traumatismos y causas externas de morbilidad con un 9% y, en tercer lugar, las enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo con un 7%, siendo relevante los problemas derivados de los discos intervertebrales (Lumbociática y Hernia del Núcleo Pulposo). Estas causas principales de morbilidad hospitalaria son similares a las observadas durante el año 2004, pero con un aumento general en la tasa de egresos por 100.000 hombres de un 5,6% el año 2005. En los tumores malignos y los traumatismos el aumento fue de un 1% y 8%, respectivamente. En el caso de cánceres, pudiera atribuirse -al igual que en la mujer- a una mayor detección y/o uso de los procedimientos diagnóstico-terapéuticos hospitalarios vinculados con estas afecciones tumorales. En el caso de los traumatismos, envenenamientos y causas externas de morbilidad, pudiera estar determinado por un aumento de su incidencia y a un aumento de la gravedad de las lesiones (fracturas) que requieren de hospitalización para su resolución.

Con excepción de las enfermedades del corazón, que se ubican en el octavo lugar de importancia, el resto de las afecciones no tiene traducción en mortalidad, como son las enfermedades de los sistemas digestivo, respiratorio y genitourinario, y las enfermedades de los ojos (Cataratas). Las hospitalizaciones por enfermedades del corazón son un 99% más frecuentes en los hombres que en las mujeres.

**CUADRO N° 7
VEINTE PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD HOSPITALARIA
EN HOMBRES, AÑO 2005**

| N° | Códigos CIE-10 | Causas | Egresos | Tasa por 100.000 hombres | % |
|----|----------------------|---|----------------|--------------------------|-------------|
| | A00-Z99 | Total | 101.649 | 7.318 | 100% |
| 1 | C00-C97 | Tumores malignos | 9.353 | 673 | 9% |
| | C15 | Tumor maligno del estómago | 38 | 3 | |
| | C61 | Tumor maligno de la próstata | 1.116 | 80 | |
| | C91-C95 | Leucemias | 1.286 | 93 | |
| | C18 | Tumor maligno del colon | 911 | 66 | |
| | C33-C34 | Tumor maligno tráquea, bronquios y pulmón | 814 | 59 | |
| | C62 | Tumor maligno de testículo | 364 | | |
| 2 | S00-T98 | Traumatismos, envenenamientos y causas externas | 8.827 | 635 | 9% |
| | S02-T12 | Fracturas | 2.970 | 214 | |
| | S03-T03 | Luxaciones, esguinces y torceduras | 1.429 | 103 | |
| 3 | M00-M99 | Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo | 7.251 | 522 | 7% |
| | M51 | Otros trastornos de los discos intervertebrales | 1.151 | 83 | |
| 4 | H00-H59 | Enfermedades del ojo y sus anexos | 5.214 | 375 | 5% |
| | H25-H26 | Cataratas | 958 | 69 | |
| | H33 | Desprendimiento de retina | 196 | 14 | |
| 5 | N00-N39 | Enfermedades del sistema genitourinario | 5.171 | 372 | 5% |
| | N20-N21 | Litiasis urinaria | 1.870 | 135 | |
| | N17-N19 | Insuficiencia renal | 1.316 | 95 | |
| 6 | K35-K38 | Enfermedades del apéndice | 3.729 | 268 | 4% |
| | K40-K46 | Hernias de la cavidad abdominal | 3.713 | 267 | 4% |
| 8 | I00-I51, excepto I41 | Enfermedades del corazón | 3.649 | 263 | 4% |
| | I20-I25 | Enfermedades isquémicas del corazón | 642 | 46 | |
| 9 | J35 | Enfermedades crónicas de las amígdalas y adenoides | 3.459 | 249 | 3% |
| 10 | N47 | Prepucio redundante, Fimosis y Parafimosis | 2.903 | 209 | 3% |
| 11 | J10-J18 | Influenza - Neumonía | 2.665 | 192 | 3% |
| 12 | K80-K81 | Colelitiasis y colecistitis | 2.391 | 172 | 2% |
| 13 | A00-A09 | Enfermedades infecciosas intestinales | 1.935 | 139 | 2% |
| 14 | F00-F52, F54-F99 | Trastornos mentales | 1.085 | 78 | 1% |
| | F32-F33 | Episodio depresivo y recurrente | 380 | 27 | |
| | F20 | Esquizofrenia | 102 | 7 | |
| | F31 | Trastorno afectivo bipolar | 90 | 6 | |
| 15 | J20-J22 | Infecciones respiratorias agudas vías aéreas inferiores | 982 | 71 | 1% |
| 16 | L00-L01 | Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo | 879 | 63 | 1% |
| 17 | J40-J46 | Bronquitis crónica y no especificada, enfisema y asma | 806 | 58 | 1% |
| 18 | N40 | Hiperplasia de la próstata | 715 | 51 | 1% |
| 19 | I60-I69 | Enfermedades cerebrovasculares | 707 | 51 | 1% |
| 20 | E10-E14 | Diabetes Mellitus | 582 | 42 | 1% |
| | | Otras causas | | - | |
| | R00-R99 | Síntomas, signos y de laboratorio no clasificados en otra parte | 4.054 | 292 | 4% |
| | | Las demás causas | 31.579 | 2.273 | 31% |

Al igual que en la mujer, las hospitalizaciones debido a trastornos mentales por cuadros depresivos agudos y recurrentes en los hombres han cobrado importancia, aun cuando la frecuencia de ocurrencia es la mitad a la observada en las mujeres. Cabe señalar, que los trastornos mentales se acercan en frecuencia a las infecciones respiratorias agudas de las vías aéreas inferiores y las enfermedades bronquiales obstructivas crónicas (Bronquitis Crónica, Enfisema y Asma), como causas de hospitalización, aun cuando este hecho puede ser atribuido, en parte, al manejo ambulatorio de estas afecciones respiratorias y que las hospitalizaciones están reservadas para los casos severos.

5. Lista ampliada de morbilidad hospitalaria

CUADRO N° 8
MORBILIDAD HOSPITALARIA SEGÚN CAUSAS DE EGRESOS Y GRUPOS DE EDAD
LISTA AMPLIADA DE MORBILIDAD EN MUJERES, AÑO 2005

| CAUSAS | Código CIE-10 | GRUPOS DE EDAD | | | | | | Total |
|---|---------------|---|-----------------------|---------|--------|--------|--------|--------|
| | | menor 1 | 01-04 | 05-14 | 15-44 | 45-64 | 65 y + | |
| | | Tasa de egresos por 100.000 beneficiarios | | | | | | |
| Aborto | O00-O08 | - | - | 4 | 648 | 40 | - | 332 |
| Atención para la anticoncepción | Z30 | - | - | 0 | 54 | 9 | - | 29 |
| Bronquitis crónica y no especificada, enfisema y asma | J40-J46 | 349 | 145 | 63 | 13 | 46 | 313 | 53 |
| Cardiopatías congénitas | Q20-Q26 | 180 | 20 | 5 | 3 | 3 | 11 | 7 |
| Cataratas | H25-H26 | 12 | 1 | 1 | 11 | 163 | 1.649 | 99 |
| Causas obstétricas directas (excepto aborto, parto y cesárea) | O10-O92 | - | - | 3 | 524 | 26 | 19 | 268 |
| Colelitiasis y colecistitis | K80-K81 | 156 | 6 | 16 | 365 | 657 | 502 | 340 |
| Desnutrición y otras deficiencias nutricionales | E40-E64 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 |
| Desprendimiento de retina | H33 | 6 | - | - | 6 | 26 | 54 | 11 |
| Diabetes Mellitus | E10-E14 | 24 | 11 | 15 | 11 | 63 | 144 | 27 |
| Endometriosis | N80 | - | - | 1 | 130 | 99 | 26 | 86 |
| Enfermedades de los dientes y estructuras de sostén | K00-K08 | 24 | 14 | 9 | 8 | 7 | 17 | 9 |
| Enfermedades hipertensivas | I10-I15 | 18 | - | 2 | 9 | 52 | 225 | 24 |
| Enfermedades reumáticas crónicas del corazón | I05-I09 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 47 | 5 |
| Enfermedades crónicas de las amígdalas y adenoides | J35 | 150 | 1.328 | 552 | 69 | 11 | 2 | 227 |
| Enfermedad por Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) | B20-B24 | - | - | 0 | - | - | - | 0 |
| Enfermedades cerebrovasculares | I60-I69 | 18 | 6 | 3 | 18 | 90 | 412 | 43 |
| Enfermedades de la glándula tiroides | E00-E07 | 18 | 1 | 5 | 49 | 125 | 127 | 56 |
| Enfermedades del apéndice | K35-K38 | 132 | 63 | 438 | 272 | 109 | 56 | 245 |
| Enfermedades del hígado | K70-K76 | 36 | 5 | 3 | 10 | 41 | 163 | 21 |
| Enfermedades infecciosas intestinales | A00-A09 | 653 | 690 | 112 | 98 | 106 | 195 | 155 |
| Epilepsia | G40-G41 | 24 | 28 | 25 | 8 | 5 | 19 | 13 |
| Episodio depresivo y recurrente | F32-F33 | - | - | 9 | 72 | 74 | 79 | 55 |
| Esclerosis Múltiple | G35 | - | - | - | 98 | 47 | 28 | 59 |
| Esquizofrenia | F20 | - | - | - | 6 | 8 | 15 | 5 |
| *Fracturas | S02-T12 | 66 | 115 | 130 | 67 | 171 | 768 | 128 |
| Hepatitis viral | B15-B19 | 6 | - | 3 | 6 | 8 | 19 | 6 |
| Hernias de la cavidad abdominal | K40-K46 | 715 | 165 | 70 | 106 | 197 | 262 | 136 |
| Infarto agudo del miocardio | I21 | - | - | - | 4 | 24 | 142 | 12 |
| Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo | L00-L01 | 66 | 50 | 24 | 40 | 53 | 105 | 43 |
| Infecciones respiratorias agudas vías aéreas inferiores | J20-J22 | 1.899 | 280 | 34 | 11 | 29 | 75 | 63 |
| Infecciones respiratorias agudas vías aéreas superiores | J00-J06 | 403 | 260 | 80 | 45 | 35 | 51 | 68 |
| Influenza - Neumonía | J10-J18 | 2.013 | 755 | 150 | 46 | 106 | 605 | 169 |
| Insuficiencia renal | N17-N19 | 12 | 7 | 10 | 27 | 106 | 502 | 56 |
| Leiomioma uterino | D25 | - | - | 0 | 264 | 645 | 71 | 266 |
| Leucemias | C91-C95 | 108 | 141 | 86 | 26 | 55 | 195 | 58 |
| Litiasis urinaria | N20-N21 | 36 | - | 4 | 92 | 115 | 45 | 72 |
| **Luxaciones, esguinces y torceduras | S03-T03 | 54 | 9 | 26 | 45 | 79 | 154 | 50 |
| Otros trastornos de los discos intervertebrales | M51 | - | - | 1 | 67 | 161 | 189 | 73 |
| Parto cesárea | O82 | - | - | 3 | 1.744 | 11 | - | 872 |
| Parto único espontáneo y con fórceps | O80-O81 | - | - | 5 | 3.085 | 26 | 9 | 1.545 |
| Prolapso genital femenino | N81 | - | - | - | 41 | 210 | 225 | 72 |
| Quemaduras y corrosiones | T20-T32 | 48 | 112 | 17 | 10 | 6 | 9 | 18 |
| Trastorno afectivo bipolar | F31 | - | - | 0 | 19 | 21 | 13 | 14 |
| Tumor benigno de la mama | D24 | 30 | - | 2 | 66 | 113 | 62 | 59 |
| Tumor maligno rectosigmoideo, recto y ano | C19-C21 | 6 | - | - | 4 | 48 | 195 | 19 |
| Tumor maligno tráquea, bronquios y pulmón | C33-C34 | 12 | - | - | 10 | 109 | 369 | 41 |
| Tumor maligno de la mama | C50 | 150 | - | - | 179 | 997 | 1.132 | 336 |
| Tumor maligno de la vesícula biliar | C23 | 6 | - | - | 2 | 15 | 15 | 5 |
| Tumor maligno de ovario | C56 | 18 | - | 1 | 19 | 163 | 257 | 53 |
| Tumor maligno del colon | C18 | 66 | - | - | 21 | 214 | 498 | 73 |
| Tumor maligno del cuello uterino | C63 | 6 | - | - | 27 | 59 | 30 | 27 |
| Tumor maligno del estómago | C15 | - | 1 | - | 1 | 5 | 21 | 2 |
| Tuberculosis | A15-A19 | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Úlcera gástrica y duodenal | K25-K26 | - | 2 | 1 | 10 | 24 | 51 | 12 |
| Várices de los miembros inferiores | I83 | - | 1 | 0 | 72 | 208 | 116 | 83 |
| Las demás causas | | 41.125 | 3.036 | 1.539 | 4.005 | 6.912 | 10.772 | 4.814 |
| Total | | 48.858 | 7.257 | 3.456 | 12.648 | 12.744 | 21.071 | 11.417 |
| * S02,S12,S22,S32,S42,S52,S62,S72,S82,S92,T02,T08,T10 y T12 | | | Tasa de egresos alta | > 100 | | | | |
| **S03,S13,S23,S33,S43,S53,S63,S73,S83,S93 y T03 | | | Tasa de egresos media | 50 -100 | | | | |
| | | | Tasa de egresos baja | < 50 | | | | |

Las mujeres tienen una tasa de egresos hospitalarios un 56% mayor que la observada en los hombres. Esto obedece a dos razones fundamentales: por un lado, alrededor de un tercio de los egresos hospitalarios realizados por mujeres están referidos a procesos reproductivos y, por otra parte, las mujeres acuden más fácilmente a los servicios médicos que los hombres. En general, lo ocurrido el año 2005 es similar a lo observado durante el año 2004.

CUADRO N° 9
MORBILIDAD HOSPITALARIA SEGÚN CAUSAS DE EGRESOS Y GRUPOS DE EDAD
LISTA AMPLIADA DE MORBILIDAD EN HOMBRES, AÑO 2005

| CAUSAS | Código CIE-10 | GRUPOS DE EDAD | | | | | | Total |
|---|------------------|--|---------------|--------------|-----------------------|--------------|---------------|--------------|
| | | menor 1 | 01-04 | 05-14 | 15-44 | 45-64 | 65 y + | |
| | | Tasas de egresos por 100.000 beneficiarios | | | | | | |
| Atención para la anticoncepción | Z30 | - | - | - | 8 | 7 | - | 5 |
| Bronquitis crónica y no especificada, enfisema y asma | J40-J46 | 585 | 229 | 100 | 9 | 36 | 227 | 58 |
| Cardiopatías congénitas | Q20-Q26 | 326 | 27 | 4 | 2 | 7 | 27 | 10 |
| Cataratas | H25-H26 | 28 | 1 | 1 | 9 | 133 | 1.362 | 69 |
| Colelitiasis y colecistitis | K80-K81 | 337 | 3 | 7 | 135 | 429 | 561 | 172 |
| Desnutrición y otras deficiencias nutricionales | E40-E64 | 6 | 4 | - | - | - | 5 | 1 |
| Desprendimiento de retina | H33 | 11 | - | 1 | 9 | 36 | 70 | 14 |
| Diabetes Mellitus | E10-E14 | 73 | 6 | 14 | 15 | 103 | 394 | 42 |
| Enfermedades de los dientes y estructuras de sostén | K00-K08 | 112 | 19 | 8 | 6 | 4 | 2 | 8 |
| Enfermedades hipertensivas | I10-I15 | 84 | 1 | 2 | 12 | 122 | 359 | 40 |
| Enfermedades reumáticas crónicas del corazón | I05-I09 | - | 2 | 2 | 1 | 12 | 32 | 4 |
| Enfermedades crónicas de las amígdalas y adenoides | J35 | 208 | 1.672 | 626 | 50 | 7 | 2 | 249 |
| Enfermedad por Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) | B20-B24 | - | - | - | 4 | 8 | - | 4 |
| Enfermedades cerebrovasculares | I60-I69 | 62 | 3 | 6 | 15 | 117 | 679 | 51 |
| Enfermedades de la glándula tiroideas | E00-E07 | 22 | 2 | 1 | 7 | 15 | 30 | 8 |
| Enfermedades del apéndice | K35-K38 | 377 | 68 | 559 | 261 | 101 | 67 | 268 |
| Enfermedades del hígado | K70-K76 | 67 | 15 | 3 | 11 | 91 | 309 | 34 |
| Enfermedades infecciosas intestinales | A00-A09 | 1.270 | 785 | 133 | 65 | 57 | 145 | 139 |
| Epilepsia | G40-G41 | 39 | 30 | 21 | 8 | 6 | 42 | 13 |
| Episodio depresivo y recurrente | F32-F33 | - | - | 4 | 36 | 39 | 15 | 27 |
| Esclerosis Múltiple | G35 | - | - | - | 39 | 55 | 32 | 32 |
| Esquizofrenia | F20 | - | - | - | 10 | 12 | 2 | 7 |
| *Fracturas | S02-T12 | 253 | 157 | 295 | 212 | 149 | 267 | 214 |
| Hepatitis viral | B15-B19 | 17 | 1 | 2 | 8 | 12 | 7 | 7 |
| Hernias de la cavidad abdominal | K40-K46 | 1.692 | 278 | 97 | 167 | 503 | 1.050 | 267 |
| Hiperplasia de la próstata | N40 | - | - | - | 1 | 172 | 696 | 51 |
| Infarto agudo del miocardio | I21 | - | - | - | 12 | 163 | 352 | 46 |
| Infecciones de la piel y del tejido subcutáneo | L00-L01 | 174 | 55 | 41 | 61 | 78 | 122 | 63 |
| Infecciones respiratorias agudas vías aéreas inferiores | J20-J22 | 2.710 | 344 | 43 | 4 | 11 | 77 | 71 |
| Infecciones respiratorias agudas vías aéreas superiores | J00-J06 | 635 | 405 | 110 | 34 | 24 | 40 | 77 |
| Influenza - Neumonía | J10-J18 | 2.653 | 907 | 155 | 48 | 100 | 986 | 192 |
| Insuficiencia renal | N17-N19 | 101 | 10 | 12 | 48 | 185 | 1.083 | 95 |
| Leucemias | C91-C95 | 11 | 246 | 157 | 44 | 105 | 230 | 93 |
| Litiasis urinaria | N20-N21 | 225 | 3 | 5 | 148 | 252 | 190 | 135 |
| **Luxaciones, esguinces y torceduras | S03-T03 | 129 | 9 | 30 | 137 | 106 | 97 | 103 |
| Otros trastornos de los discos intervertebrales | M51 | 51 | - | 2 | 84 | 166 | 242 | 83 |
| Prepucio redundante, Fimosis y Parafimosis | N47 | 422 | 1.045 | 513 | 71 | 35 | 45 | 209 |
| Quemaduras y corrosiones | T20-T32 | 118 | 102 | 19 | 7 | 8 | 12 | 17 |
| Trastorno afectivo bipolar | F31 | - | - | 2 | 8 | 10 | 5 | 6 |
| Tumor benigno de la mama | D24 | 6 | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 |
| Tumor maligno rectosigmoideo, recto y ano | C19-C21 | 45 | - | - | 3 | 49 | 252 | 18 |
| Tumor maligno tráquea, bronquios y pulmón | C33-C34 | 28 | - | - | 7 | 195 | 676 | 59 |
| Tumor maligno de la mama | C50 | 28 | - | - | 0 | 6 | 5 | 2 |
| Tumor maligno de la próstata | C61 | 22 | - | - | 2 | 202 | 1.467 | 80 |
| Tumor maligno de la vesícula biliar | C23 | - | - | - | 0 | 11 | 27 | 3 |
| Tumor maligno de testículo | C62 | 11 | - | 1 | 42 | 18 | 10 | 26 |
| Tumor maligno del colon | C18 | 28 | 1 | - | 11 | 186 | 893 | 66 |
| Tumor maligno del estómago | C15 | - | - | - | 0 | 10 | 25 | 3 |
| Tuberculosis | A15-A19 | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Úlcera gástrica y duodenal | K25-K26 | 11 | - | 4 | 13 | 30 | 70 | 15 |
| Várices de los miembros inferiores | I83 | - | 3 | 6 | 39 | 96 | 75 | 42 |
| Las demás causas | | 39.020 | 3.616 | 2.002 | 2.752 | 5.705 | 14.626 | 4.017 |
| Total | | 52.000 | 10.051 | 4.988 | 4.675 | 9.991 | 27.997 | 7.318 |
| * S02, S12, S22, S32, S42, S52, S62, S72, S82, S92, T02, T08, T10 y T12 | | | | | Tasa de egresos alta | > 100 | | |
| ** S03, S13, S23, S33, S43, S53, S63, S73, S83, S93 y T03 | | | | | Tasa de egresos media | 50 - 100 | | |
| | | | | | Tasa de egresos baja | < 50 | | |

A diferencia de la mujer, los hombres concentran sus ingresos hospitalarios en los extremos de la vida, esto es, en los menores de 4 años y en los mayores de 65 años. En el primer grupo, son por enfermedades agudas, especialmente, infecciosas y, en el segundo grupo, obedecen a enfermedades crónicas, entre las que son relevantes los tumores malignos, la insuficiencia renal, las enfermedades cerebrovasculares y las hernias de la cavidad abdominal.

En general, al igual que en la mujer, lo ocurrido el año 2005 es similar a lo observado durante el año 2004, con excepción de la tasa de egresos por 100.000 hombres que fue un 5,6% mayor.